



GYN-KBH.DK

Stimulationsbehandling med Gonal-F, Pergoveris eller Menopur

- Ring til klinikken på din 1. menstruationsdag for at aftales tid til ultralydsskanningen 2. - 4. cyklusdag. Hvis menstruationen starter fredag eftermiddag eller lørdag, møder du i klinikken mandag morgen.
- Behandling og plan aftales, der laves recepter på medicin og behandlingen gennemgås efterfølgende med sygeplejerske.
- Næste Ultralydsskanningen af dine æg blærer foregår typisk på din 8.- 11. cyklusdag.
- Når dine æg blærer er den rette størrelse, vil du blive instrueret i at tage din æg løsende sprøjte Ovitrelle.
- Du medgives en graviditetstest som du skal tage 14-16 dage efter insemination eller planlagt samleje.

Hvis du skal insemineres

- Du får udleveret et sædopsamlings sæt samt 2 blanketter til underskrift inden du går hjem. Husk at medbringe dem i underskrevet stand, sammen med afleveringen af sædprøven på inseminationsdagen. I klinikken underskriver du og din partner desuden en blanket- *Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab.*
- 1½ døgn efter, at du har taget den æg løsende sprøjte, afleveres sædprøven i klinikken mellem kl. 7.30-9.00.
- Husk at prøven skal opbevares ved kropstemperatur under transporten til klinikken, og optimalt må den max være 2 timer gammel. Senere på dagen møder du, til aftalt tid, til insemination. Den oprensede sæd lægges op i din livmoder via et lille tyndt kateter.
- 1½ døgn efter insemination skal du starte behandling med Lutinus vaginaltabletter 3 gange dagligt. Hvis graviditetstesten er positiv, skal du fortsætte behandlingen til 10. graviditetsuge.
- 14-16 dage efter insemination tager du en graviditetstest. Du ringer derefter til klinikken, og afhængigt af resultatet, planlægger vi det videre forløb.

Revideret august 2019. Godkendt af LBE

OVERLÆGE/SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI

Lisbeth Elving

LYGTEN 2 C, 4. th. * 2400 KBH. NV.

TIDSBESTILLING DAGLIGT KL. 9:30 - 12:00. TLF. +45 35840977